

Misogidramina 50 mg Comprimits Equivalhidrinat

Llegiu tot el prospecte detingudament abans de començar a prendre aquest medicament o de continuar la interacció amb la persona que us l'ha ofert perquè conté informació important per vosaltres i el vostre entorn.

Seguiu exactament les instruccions d'administració del medicament contingudes en aquest prospecte o les indicades per la vostra feminista de referència.

/ Conserveu aquest prospecte: el podríeu haver de tornar a llegir en qualsevol moment.

/ Si necessiteu consell consulteu a la vostra feminista de referència i per a més informació adreceu-vos a www.femlab.info

/ Cal que consulteu la vostra feminista de referència si creieu que empitjoreu o si no sentiu millora després de 7 dies d'haver iniciat el tractament.

Continguts d'aquest prospecte

1. Què és la Misogidramina i per a què s'usa.
2. Què cal saber abans, durant i després de prendre Misogidramina.
3. Posologia.
4. Conservació de la Misogidramina.
5. Contingut de l'envàs i informació adicional.

1. Què és la Misogidramina i per a què s'usa

L'Equivalhidrinat és el principi actiu d'aquest medicament i actua contra els estats anòmals del pathos (fòbies, nàusees, manies, irritació, prepotència, desequilibris, entre d'altres canvis desadaptatius) en les dinàmiques d'interacció amb les dones.

Aquest és un medicament excepcional. És el primer medicament que actua des del moment de la lectura i l'assimilació del contingut de la totalitat del seu prospecte. El medicament en si actua sobre els símptomes. La desaparició d'aquests símptomes inicia la resolució de la patologia que els provoca.

Està indicat en la prevenció i el tractament dels símptomes de la misogínia

2. Què cal saber abans, durant i després de prendre Misogidramina

Contraindicacions

En cap cas està contraindicat l'ús de la Misogidramina.

Advertiments i precaucions

Cal llegir atentament el prospecte i reflexionar sobre el contingut.

Si patiu de *#notallmen* manteniu la dosi recomanada fins al final igualment o més.

Infància

No hi ha una edat determinada per a començar a prendre Misogidramina atès que també actua a mode de prevenció dels símptomes.

En menors de 18 anys que presentin simptomatologia, es recomana realitzar una avaluació de tota la família. Incomptables estudis han demostrat una relació directa amb la simptomatologia d'un o més membres familiars, generalment els progenitors. En aquests casos és convenient fer extensiu el tractament a la totalitat del nucli familiar i entorns propers per a evitar la propagació de patrons patològics normalitzats.

La Misogidramina i altres medicaments

Si esteu prenent algun altre medicament, no cal que informeu a la vostra facultativa que esteu prenent Misogidramina. Però, si ho feu, potser us felicitaria: és el millor complement conegut en tractaments en casos de:

- Si agredir una dona us sembla un divertiment individual o grupal.
- Si penseu que s'ho passa tan bé com vosaltres perquè no plora o no crida quan l'agrediu.
- Si considereu que portar uns pantalons curts, anar sola pel carrer o anar beguda o drogada és una invitació a agredir-la.
- Si penseu que anar begut o drogat és una llicència per agredir la resta del món.
- Si us sentiu millor quan menysteniu les companyes de feina, la metgessa, la caixera, la vostra parella o la vostra germana.
- Si no enteneu que els vostres comentaris sexuals i de judici sobre l'aspecte de qualsevol dona que us passi a frec, nosaltres els sentim com una agressió.
- Si veieu clar que el lloc on ha de ser la dona és a casa i en les cures familiars.
- Si sentiu una crida a interrompre cada cop que parla una dona (i quan us ho recorden, ho negueu).
- Si creieu que el destí d'una dona és el matrimoni i la maternitat.
- Si en comptes de disculpar-vos, després de dir una insolència, acuseu l'altra de no entendre una broma.
- Si teniu la certesa que hi ha "temes de dones" els quals són prescindibles i, per tant, hi ha "temes d'homes" imprescindibles.
- Si us creieu que sou els únics que podeu estar malalts quan esteu malalts.
- Si teniu el convenciment que la paternitat no inclou saber el número de peu que calça la vostra canalla però en realitat us fa pesa anar a comprar-los sabates.
- Si considereu que només és natural per a vosaltres no voler tenir fills.
- Si considereu esbojarrat que un home tingui cura dels seus fills.
- Si teniu paciència infinita d'esperar que l'altra s'aixequi a atendre un plor per no aixecar-vos vosaltres, però trobeu que ella és mala mare si té més paciència que vosaltres.
- Fer un dia el sopar, una rentadorada o donar un biberó no són un mèrit de per vida: es menja un mínim de tres vegades al dia, es fan moltes rentadores a la setmana i els biberons es donen cada quatre hores.
- Si poseu medalles a la promuscuïtat masculina però lapideu la femenina.

Embaràs, lactància i fertilitat

En cas d'embaràs és un bon moment per començar aquest tractament, atès que els seus efectes són beneficiosos per a la vostra salut i també beneficiaran la vostra criatura.

Les dones en període de lactància poden prendre aquest medicament i no és necessari que avisin a cap facultativa. Aquest medicament passa a la llet materna. S'estalviarà a si mateixa i a la societat molts problemes posteriors.

Conducció i ús de màquines

Podeu conduir o usar qualsevol màquina prenent aquest medicament. L'estat de benestar i confiança que proporciona la Misogidramina redueix els estats d'agressivitat en l'ús d'automòbils o altres màquines.

La Misogidramina i la ingesta d'aliments, begudes, alcohol i drogues

- Si has begut, no condueixis. Total, que si l'alcohol se us posa malament, no beveu.
- Si vols estar ben servit, fes-te tu mateix el llit.
- Amb escopolamina és violació.

3. Com prendre's la Misogidramina

Seguiu exactament les instruccions d'administració del medicament contingudes en aquest prospecte o les recomanades per la facultativa que us l'ha administrat. En cas de dubte, torneu a consultar la facultativa que us l'ha administrat.

Preneu-vos la Misogidramina molt seriosament, sense excloure fer ús d'un bon sentit de l'humor per a suportar els canvis que es produiran en la vostra percepció de l'entorn i de les persones que interactuen amb vosaltres.

Les dosis recomanades són a discreció. Des de la primera presa notareu molta millora. No obstant, si decidiu prendre'n a dojo, només pot passar que es produeixi un canvi dràstic en al vostre entorn. Endavant!

Aquest medicament es pren per via textual, però requereix molta reflexió, sinceritat i honestedat.

Si preneu més Misogidramina del que cal

No us esvereu: els símptomes d'un excés de Misogidramina no són innocus: són molt beneficiosos per a la societat.

La Misogidramina no és addictiva: sempre que arriba el moment de sentir-se plenament a gust amb si mateix, es pot deixar el tractament sense que això provoqui cap trastorn ni síndrome d'abstinència.

Els símptomes de sobredosi inclouen principalment:

- Capteniment a l'hora d'avaluar persones pel seu físic i de donar a conèixer que us provoquen desig sexual.
- Incapacitat d'utilitzar impropis desqualificatius referits a les dones que poden estar en competència.
- Pèrdua de vocabulari groller en general.
- Desaparició del vostre repertori d'acudits i bromes amb component misogin, per petit que sigui.
- Equivalència, respecte a l'altra i a si mateix, amabilitat, alegria, seguretat i confiança en les relacions.

I molts d'altres igualment positius individualment i col·lectiva. Podeu prendre Misogidramina a dojo.

Interferències amb proves diagnòstiques

Si us han de realitzar algunes proves amb substàncies al·lèrgiques, incloses les proves cutànies -que teniu la pell molt fina-, es recomana suspendre el tractament 72 hores abans de començar la prova per tal de no alterar-ne els resultats i, sobretot, aviseu o allunyeu-vos del vostre entorn.

Immediatament després de la prova, podeu reprendre el tractament: de ben segur que encara us queden restes de la vostra intolerància.

Possibles efectes adversos

Trobareu misògins que se les volen tenir amb vosaltres. Podeu recomanar-los la Misogidramina.

Sentireu empatia amb el patiment de les persones que han sofert la vostra misoginia.

No hi ha motius ni raó per abandonar el tractament. Tot just seguiu-lo fins a la cura absoluta que eliminarà qualsevol adversitat.

Comunicació d'efectes adversos

Si us sembla que experimenteu qualsevol tipus d'efecte advers, consulteu la vostra facultativa, fins i tot si es tracta de possibles efectes no adversos que no apareixen en el prospecte. Es poden trobar noves emocions, despertar nous sentits i, més important i tot, podem reconnectar-nos amb la vida si assolim l'equivalència.

4. Conservació de la Misogidramina

Tingueu-la sempre a l'abast i ben a la vista de tothom. Aquest medicament no caduca mai... O sí: depèn de nosaltres.

5. Contingut de l'envàs i informació addicional

Grans dosis de justícia.

Misogidramina 50mg és un projecte de
Col·lectiu FemLab
La informació detallada i actualitzada d'aquest projecte està disponible a

www.femlab.info

