

Mizogydramina 50 mg Tabletki powlekane Hydrynat Równoważności

**Przeczytaj uważnie całą ulotkę przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku lub kontynuuj interakcję z osobą, która Ci go poleciła. Zawiera ona ważne informacje dla Ciebie i Twojego otoczenia.**

Należy dokładnie stosować się do zaleceń dotyczących stosowania leku podanych w niniejszej ulotce lub przekazanych przez osobę która ci go poleciła.

/ Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

/ Jeśli potrzebujesz porady, skontaktuj się z zaprzyjaźnioną feministką. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z [www.femlab.info](http://www.femlab.info)

/ Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub jest jeszcze gorzej, należy skontaktować się z zaprzyjaźnioną feministką.

## Spis treści ulotki

1. Co to jest Mizogydramina i do czego służy
2. Co musisz wiedzieć przed, w trakcie i po zażyciu Mizogydrminy
3. Jak stosować Mizogydramine
4. Jak przechowywać Mizogydramine
5. Zawartość opakowania i dodatkowe informacje

### 1. Co to jest Mizogydramina i w jakim celu się ją stosuje

Hydrat Równoważności jest substancją czynną tego leku i działa przeciwko nieprawidłowym stanom patosu (fobiami, mdłościami, obsesjami, poirytowaniem, arogancją, zaburzeniami równowagi i innymi zmianami nieadaptacyjnymi) w dynamice interakcji z kobietami.

To jest wyjątkowe lekarstwo. Jest to pierwszy lek, który działa od momentu przeczytania i przyswojenia całej zawartości ulotki dołączonej do opakowania. Lek sam w sobie działa na objawy. Zanik tych objawów inicjuje rozwiązanie patologii, która je powoduje.

Jest on wskazany do zapobiegania i leczenia objawów mizoginizmu.

### 2. Co powinieneś wiedzieć przed, podczas i po zażyciu Mizogydrminy

#### Przeciwwskazania

W żadnym wypadku użycie Mizogydrminy nie jest przeciwwskazane.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przeczytaj uważnie tę ulotkę i zastanów się nad jej treścią.

Jeśli cierpisz na syndrom #notallmen, zażywaj zalecaną dawkę lub nawet zwiększ ją

#### Dzieci i młodzież

Nie ma odpowiedniego wieku, aby rozpocząć przyjmowanie Mizogydrminy, ponieważ działa ona również zapobiegawczo przeciwko możliwym objawom. U dzieci poniżej 18 roku życia z objawami zaleca się przeprowadzenie wywiadu rodzinnego. Niezliczone badania wykazały bezpośredni związek z objawami jednego lub więcej członków rodziny, zazwyczaj rodziców. W tych przypadkach zalecane jest rozszerzenie leczenia na całą rodzinę, aby uniknąć rozprzestrzeniania się znormalizowanych wzorców patologicznych.

#### Mizogydramina a inne leki

Jeśli jesteś w trakcie innego leczenia, nie musisz informować swojego lekarza o spożyciu Mizogydrminy. Ale jeśli to zrobisz, może ci pogratulować: jest to najbardziej znany dodatek do leczenia w poniższych przypadkach:

- Jeśli napad na kobietę wydaje się być rozrywką indywidualną lub grupową.
  - Jeśli uważasz, że tak dobrze się z tobą bawi, bo nie płacze i nie krzyczy, gdy jest napastowana.
  - Jeśli uważasz, że noszenie szortów, samotne chodzenie po ulicy, bycie pijanym lub na haju jest zaproszeniem do ataku.
  - Jeśli uważasz, że bycie pijanym lub naćpanym to licencja na atak na resztę świata
  - Jeśli czujesz się lepiej, gdy bagatelizujesz swoją koleżankę z pracy, lekarkę, kasjerkę, partnerkę lub siostrę.
  - Jeśli nie rozumiesz, że twoje seksualne i osądające komentarze na temat wyglądu przechodzącej obok ciebie kobiety sprawiają, że czują się one napastowane.
  - Jeśli uważasz, że miejsce kobiety jest w domu i przy rodzinie.
  - Jeśli czujesz się że musisz przerwać kobiecie za każdym razem gdy ona mówi (a gdy Ci się to wypomina, zaprzeczasz).
  - Jeśli uważasz, że przeznaczeniem kobiety jest małżeństwo i macierzyństwo.
  - Jeśli zamiast przeprosić po wrzuceniu beczelnej uwagi, oskarżasz o niezrozumienie żartu.
  - Jeśli uważasz, że są "sprawy kobiet", które są zbędne, a więc są "sprawy mężczyzn", które są niezbędne.
  - Jeśli uważasz, że jesteś jedyną osobą, która ma prawo zachorować, gdy jesteś chory.
  - Jeśli jesteś przekonany, że rodzicielstwo nie obejmuje wiedzy na temat rozmiaru butów Twoich dzieci, ale w rzeczywistości jesteś zbyt leniwy, aby iść je kupić.
  - Jeśli uważasz, że to naturalne, że mężczyźni nie chcą mieć dzieci.
  - Jeśli uważasz, że to szalone, aby mężczyzna zajmował się swoimi dziećmi.
  - Jeśli masz nieskończoną cierpliwość, aby poczekać na nią, żeby to ona wstała i zajęła się płaczącym dzieckiem, abyś Ty nie musiał wstawać, ale myślisz, że ona jest złą matką bo ma więcej cierpliwości niż ty.
- Zrobienie obiadu jednego dnia, załadowanie pralki lub podgrzanie butelki z mlekiem nie jest osiągnięciem na całe życie: jesz minimum trzy razy dziennie, nastawiasz wiele pralek tygodniowo i karmisz dzieci co cztery godziny.

- Jeśli uważasz że męska rozwiążłość jest osiągnięciem medalowym, a kobietą należy potępiać.

### **Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność**

Jeśli jesteś w ciąży, jest to dobry moment, aby rozpocząć ten zabieg, ponieważ jego efekty są korzystne dla Twojego zdrowia, a także będą korzystne dla Twojego dziecka.

Kobiety karmiące piersią mogą przyjmować ten lek i nie muszą powiadamiać swojego lekarza. Ten lek przechodzi do mleka matki. Oszczędzi to tobie i społeczeństwu wielu problemów później.

### **Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn**

Podczas przyjmowania tego leku można prowadzić samochód lub używać dowolnej maszyny. Stan dobrego samopoczucia i pewności siebie zapewniony przez Mizogydramine zmniejsza stany agresji w korzystaniu z samochodów i innych maszyn.

### **Stosowanie Mizogydraminy z jedzeniem, pić alkoholu i zażywaniem narkotyków**

- Jeśli pijesz, nie prowadź. Więc, jeśli alkohol ci nie smakuje, nie pij.
- Chcesz sobie zrobić dobrze? Użyj swojej ręki.
- Pamiętaj, z tabletką gwałtu będzie to przestępstwo

## **3. Jak stosować Mizogydraminę**

Należy dokładnie przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania leku zawartych w niniejszej ulotce lub zaleceń osoby, która ci ją poleciła. W razie wątpliwości, należy poradzić się osoby, która Ci ją poleciła.

Traktuj Mizogydraminę poważnie, ale nie wykluczaj odpowiedniej dawki poczucia humoru, aby poradzić sobie ze zmianami, które nastąpią w twoim postrzeganiu otoczenia i ludzi, którzy z tobą współpracują.

Zalecane jest dawkowanie według własnego uznania. Zauważysz poprawę już od pierwszej dawki. Jeśli jednak zdecydujesz się zażyć ile wlezie, może się zdarzyć tylko to, że w twoim otoczeniu nastąpi drastyczna zmiana. Śmiało!

Ten lek jest przyjmowany "dosłownie", ale wymaga wielu przemyśleń, uczciwości i rozwagi.

### **Przyjęcie większej niż zalecana dawki**

W przypadku zażycia większej dawki Mizogydraminy niż potrzebujesz, nie bój się. Objawy nadmiaru Mizogydraminy są nieszkodliwe, a nawet są bardzo korzystne dla społeczeństwa.

Mizogydramina nie jest uzależniająca: kiedy tylko przyjdzie czas, aby czuć się całkowicie swobodnie ze sobą, można opuścić leczenie nie powodując żadnych zaburzeń lub objawów odstawienia.

- Powściągliwość w ocenianiu ludzi pod względem ich cielesności lub w ujawnianiu, że wzbudzają pożądanie seksualne.
- Niezdolność do stosowania dyskwalifikujących wypowiedzi dotyczących kobiet
- Całkowita znik obrazliwego słownictwa
- Zniknięcie repertuaru żartów i żartów z jakimikolwiek elementem mizoginistycznym
- Równoważność, szacunek dla innych i samego siebie, życzliwość, radość, bezpieczeństwo i zaufanie w relacjach.

I wielu innych pozytywnych indywidualnych i zbiorowych. Możesz brać Mizogydraminę jak szalony.

### **Wpływ Mizogydraminy na wyniki badań**

W przypadku konieczności wykonania niektórych badań z użyciem substancji alergicznych, w tym testów skórnych - szczególnie jeśli jesteś ZA wrażliwy - zaleca się przerwanie zabiegu na 72 godziny przed rozpoczęciem badania, aby nie wpłynąć na wyniki, a przede wszystkim aby ostrzec lub oddalić się od swojego otoczenia.

Bezpośrednio po badaniu można wznowić leczenie: na pewno pozostały ślady nietolerancji.

### **Możliwe działania niepożądane**

Spotkasz mizoginicznych ludzi, którzy będą próbowali cię przeciągnąć na swoją stronę. Możesz polecić im Mizogydraminę.

Będziesz odczuwał współczucie wobec ludzi, którzy cierpieli z powodu twojej mizoginii.

Nie ma powodu ani powodu, by rezygnować z terapii. Po prostu stosuj leczenie aż do absolutnego uzdrowienia które wyeliminuje wszelkie przeciwności.

### **Zgłaszanie działań niepożądanych**

Jeśli uważasz, że doświadczasz jakichkolwiek skutków ubocznych, nawet jeśli nie są one wymienione w niniejszej ulotce, porozmawiaj z osobą którą ci poleciła terapię. Mogą pojawić się nowe emocje, mogą się obudzić nowe zmysły, a co najważniejsze, można ponownie połączyć się z życiem i osiągnąć równowagę.

## **4. Przechowywanie Mizogydraminy**

Zawsze miej ją pod ręką i na oczach wszystkich. Ten lek nigdy nie traci ważności... Albo i tak: to zależy od nas wszystkich.

## **5. Zawartość opakowania i dodatkowe informacje**

Duża dawka sprawiedliwości.

Mizogydramina 50mg to projekt  
**KOLEKTY W FemLab**

Szczegółowe i aktualne informacje na temat tego projektu są dostępne na stronie internetowej

**www.femlab.info**

